

2 被害の確認方法

他種との見分け方（フラス編）

- ひき肉状に固まったもの ⇒ クビアカ
ただし、古いと風化して一見粉状に
ごま粒をスライスしたような粒子を含む
- ゴマダラカミキリと似るが、
ゴマダラは大きな繊維が
目立つ場合が多い
（予防的处理を推奨）



2 被害の確認方法

他種との見分け方（フラス編）

- 赤褐色で、ひき肉状に固まったもの ⇒ クビアカ
ただし、古いと風化して一見粉状に
ごま粒をスライスしたような粒子を含む


- 粉末状で色が暗い
⇒ シリアゲアリ類



2 被害の確認方法

他種との見分け方（フラス編）

- ひき肉状に固まったもの ⇒ **クビアカ**
ただし、古いと風化して粉状に
ごま粒をスライスしたような粒子を含む
- ヤニの塊とひとまとまりになった糞
- 大きさの揃った球状の粒子
⇒ ガ類（コスカシバ、ヒメボクトウ）



2 被害の確認方法

スマートフォンでも特徴が分かる写真を撮影可能

※引きの写真（フラスの排出量が分かるもの）もあるとよい



2 被害の確認方法

他種との見分け方（脱出口編）

- 主に生材部に楕円の穴＋大量のフラス

⇒ クビアカ

- 古い材部に楕円の穴

⇒ ウスバカミキリ

- 主に死んだ材を摂食
- 都市部でも見られる
- フラスはゴマダラと同じ繊維状



クビアカ



ウスバ



ウスバ

2 被害の確認方法

他種との見分け方（脱出口編）

- 主に生材部に楕円（長径2～3cm）の穴
＋大量のフラス
⇒ クビアカ
- 生材部に真ん丸（直径1～1.5cm）の穴
⇒ ゴマダラカミキリ

